

5つの生薬を配合した便秘薬

和漢薬

ササラック

第②類医薬品

『和漢薬ササラックの特長』

便秘は腹部膨満や食欲不振などのいろいろの不快感を持たせるばかりでなく、肌ツヤをなくしたり、吹出物などの原因にもなったりします。和漢薬ササラックはダイオウ、センナ、カンゾウ、シャクヤク、ハッカの五つの天然生薬を配合した生薬製剤ですので、化学合成品の製剤に比べて習慣性が少なく、穏やかな作用で、便秘特有のいやな症状を解消します。和漢薬ササラックは朝のさわやかな便通を得るために、それぞれの症状にあわせて用量を増減してお服みになることができます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。 (6) 次の症状のある人。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状がある場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

1日1～3回 1日3回を限度とし、なるべく空腹時に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3/4包～1包	1～3回
11歳以上～15歳未満	1/2包～2/3包	
7歳以上～11歳未満	2/5包～1/2包	
3歳以上～7歳未満	1/4包～1/3包	
3歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

成 分	1日量 4.5g (3包) 中
ダイオウ末	1.0g
センナ末	1.0g
カンゾウ末	0.6g
シャクヤク末	0.5g
ハッカ末	0.5g

添加物としてトウモロコシデンプンを含有します。

[注 意] 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わったりします。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室 **0120-432-894** (フリーコール)

[月～金曜日/10:00～12:00 13:00～17:00 (祝日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193